

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Na 5 dni przed badaniem należy przestać przyjmować leki rozrzedzające krew: acenocumarol, polocard, acard, itp. (po uzgodnieniu z lekarzem)

Na tydzień przed badaniem należy przestać jeść:

- ziarna na pieczywie i w pieczywie, musli, maku, buraczków, kaszy, kapusty
- owoce pestkowe (winogrono, kiwi)
- warzywa i owoce obierać ze skórki i usuwać pestki

Przeddzień badania:

Rano zjeść śniadanie.

Od godz. 17.00 zacząć pić preparat **CitaFleet**. Zawartość jednej saszetki wsypać do kubka wielkości 250 ml. Oczekać 2 min mieszając dokładnie zawartość. Mętną zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu. Po wypiciu preparatu w czasie 2 godzin wypić jeszcze 2 litry wody. Jeżeli po wypiciu nie występują wypróżnienia żółtym klarownym płynem należy dopijać wodę!

W dniu badania:

Okolo **sześć godzin przed** badaniem powtórzyć kroki jak poprzedniego dnia dotyczące przyjmowania leku CitaFleet.

Jeżeli po wypiciu nie występują wypróżnienia żółtym klarownym płynem należy dopijać wodę!

Należy zażyć lekarstwa brane na stałe.