

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Na 5 dni przed badaniem należy przestać przyjmować leki rozrzedzające krew: acenocumarol, polocard, acard, itp. (po uzgodnieniu z lekarzem)

Na tydzień przed badaniem należy przestać jeść:

- ziarna na pieczywie i w pieczywie, musli, maku, buraczków, kaszy, kapusty
- owoce pestkowe (winogrono, kiwi)
- warzywa i owoce obierać ze skórki i usuwać pestki

Przeddzień badania:

Rano zjeść śniadanie.

Od godz. 17.00 zacząć pić preparat **Ezielen**. Otworzyć jedną butelkę leku. Wlać jej zawartość do załączonego kubka i dolać wody do kreski na kubku. Wypić cały płyn bez pośpiechu od 30 do 60 min. Wypić jeszcze dwa kubki wypełnione do kreski wodą lub czystym płynem przez następną godzinę.

Jeżeli po wypiciu nie występują wypróżnienia żółtym klarownym płynem należy dopijać wodę.

W dniu badania:

Okolo **sześć godz. przed** badaniem powtórzyć kroki jak poprzedniego dnia dotyczące przyjmowania leku Ezielen.

Należy zażyć lekarstwa brane na stałe.