

## PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Na 5 dni przed badaniem należy przestać przyjmować leki rozrzedzające krew: acenocumarol, polocard, acard, itp. (po uzgodnieniu z lekarzem)

Na tydzień przed badaniem należy przestać jeść:

- ziarna na pieczywie i w pieczywie, musli, maku, buraczków, kaszy, kapusty
- owoce pestkowe (winogrono, kiwi)
- warzywa i owoce obierać ze skórki i usuwać pestki

*Przeddzień badania:*

Rano zjeść śniadanie.

Od godz. 17.00 zacząć pić preparat **Ezielen**. Otworzyć jedną butelkę leku. Wlać jej zawartość do załączonego kubka i dolać wody do kreski na kubku. Wypić cały płyn bez pośpiechu od 30 do 60 min. Wypić jeszcze dwa kubki wypełnione do kreski wodą lub czystym płynem przez następną godzinę. **Należy wypić powyżej 2 litrów wody.**

Jeżeli po wypiciu nie występują wypróżnienia żółtym klarownym płynem należy dopijać wodę.

*W dniu badania:*

Około **sześć godz. przed** badaniem powtórzyć kroki jak poprzedniego dnia dotyczące przyjmowania leku Ezielen.

**UWAGA: Rozpoczęcie wcześniejsze lub/i zmniejszenie ilości wypijanej objętości preparatu lub wody znacznie zmniejszy skuteczność przygotowania, a tym samym jakość badania.**

Należy zażyć lekarstwa brane na stałe.

## PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Na 5 dni przed badaniem należy przestać przyjmować leki rozrzedzające krew: acenocumarol, polocard, acard, itp. (po uzgodnieniu z lekarzem)

Na tydzień przed badaniem należy przestać jeść:

- ziarna na pieczywie i w pieczywie, musli, maku, buraczków, kaszy, kapusty
- owoce pestkowe (winogrono, kiwi)
- warzywa i owoce obierać ze skórki i usuwać pestki

*Przeddzień badania:*

Rano zjeść śniadanie.

Od godz. 17.00 zacząć pić preparat **Ezielen**. Otworzyć jedną butelkę leku. Wlać jej zawartość do załączonego kubka i dolać wody do kreski na kubku. Wypić cały płyn bez pośpiechu od 30 do 60 min. Wypić jeszcze dwa kubki wypełnione do kreski wodą lub czystym płynem przez następną godzinę. **Należy wypić powyżej 2 litrów wody.**

Jeżeli po wypiciu nie występują wypróżnienia żółtym klarownym płynem należy dopijać wodę.

*W dniu badania:*

Około **sześć godz. przed** badaniem powtórzyć kroki jak poprzedniego dnia dotyczące przyjmowania leku Ezielen.

**UWAGA: Rozpoczęcie wcześniejsze lub/i zmniejszenie ilości wypijanej objętości preparatu lub wody znacznie zmniejszy skuteczność przygotowania, a tym samym jakość badania.**

Należy zażyć lekarstwa brane na stałe.