

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Na 5 dni przed badaniem należy przestać przyjmować leki rozrzedzające krew: acenocumarol, polocard, acard, itp.

Na tydzień przed badaniem należy przestać jeść:

- ziarna na pieczywie i w pieczywie, musli, maku, buraczków, kaszy, kapusty
- owoce pestkowe (winogrono, kiwi)
- warzywa i owoce obierać ze skórki i usuwać pestki

Przeddzień badania

Rano zjeść śniadanie.

Od godz. 17.00 zacząć pić **Fortans**. Rozpuścić 2 saszetki każdą w 1 litrze wody. Pić co 15 min. szklankę płynu. Można dopijać czystą wodę w dowolnej ilości.

W dniu badania

Okolo **sześć godzin przed** badaniem rozpuścić pozostałe dwie saszetki, każdą w litrze wody i wypić co 15 min. szklankę.

Jeżeli po wypiciu nie występują wypróżnienia żółtym klarownym płynem proszę dopijać wodę.

UWAGA: Rozpoczęcie wcześniejsze lub/i zmniejszenie ilości wypijanej objętości preparatu lub wody znacznie zmniejszy skuteczność przygotowania, a tym samym jakość badania.

Należy zażyć lekarstwa brane na stałe.

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Na 5 dni przed badaniem należy przestać przyjmować leki rozrzedzające krew: acenocumarol, polocard, acard, itp.

Na tydzień przed badaniem należy przestać jeść:

- ziarna na pieczywie i w pieczywie, musli, maku, buraczków, kaszy, kapusty
- owoce pestkowe (winogrono, kiwi)
- warzywa i owoce obierać ze skórki i usuwać pestki

Przeddzień badania

Rano zjeść śniadanie.

Od godz. 17.00 zacząć pić **Fortans**. Rozpuścić 2 saszetki każdą w 1 litrze wody. Pić co 15 min. szklankę płynu. Można dopijać czystą wodę w dowolnej ilości.

W dniu badania

Okolo **sześć godzin przed** badaniem rozpuścić pozostałe dwie saszetki, każdą w litrze wody i wypić co 15 min. szklankę.

Jeżeli po wypiciu nie występują wypróżnienia żółtym klarownym płynem proszę dopijać wodę.

UWAGA: Rozpoczęcie wcześniejsze lub/i zmniejszenie ilości wypijanej objętości preparatu lub wody znacznie zmniejszy skuteczność przygotowania, a tym samym jakość badania.

Należy zażyć lekarstwa brane na stałe.